

16 Balogh 1938
 scheinlich zufälligerweise mit verschiedenen Pflanzenarten hierher gebracht, die sich der Inhaber des Gartens aus der Nähe von Fiume anschaffen liess. Da ich kleinere und grössere Exemplare dieser Art beobachten konnte, muss angenommen werden, dass sie schon seit Jahren in diesem Garten lebt und sich auch wahrscheinlich fortpflanzen kann. Ob der strenge Winter von 1937/1938 den Tieren geschadet hat — weiss ich noch nicht, da ich die Schnecken seit Herbst nicht wiedersehen konnte. Meines Wissens ist das die erste Angabe, dass eine mediterrane Schneckenart bei uns einheimisch wurde und sich fortpflanzte.

NOVA DATA ARACHNOLOGICA E MONTIBUS BÖRZSÖNYIENSIS

(Stud. Aran. 9.)

Conscripta a Dre J. BALOGH.

Aranearum species 63 infra enumeratae in his locis lectae sunt:

- 1.) Nagymaros, 7. VI. 1930, leg: autor,
- 2.) Zebegény, 30. VII. 1931, leg: autor,
- 3.) Zebegény, 15. V. 1932, leg: autor,
- 4.) Zebegény, 15. VI. 1935, leg: Z. KASZAB.

Qui numeri uncis includentes post nomina araneorum significantur. Systema et nomenclatura eadem, atque in opere Cel. ROEWERII (Araneae in: Die Tierwelt Mitteleuropas, Bd. 3, Abt. VI, pp. 144).

Drassidae: Drassodes lapidosus (1, 4), Drassodes dalmatensis (1), Scotophaeus scutulatus (2), Zelotes praeficus (1), Zelotes apicorum (1), Gnaphosa lucifuga (1).

Sparassidae: Micrommata viridissima (1, 2, 4).

Thomisidae: Thomisus albus (2, 4), Pistius truncatus (1), Misumena tricuspidata (4), Misumena calycina (4), Runcinia lateralis (4), Diaea dorsata (4), Synema globosum (4), Oxyptila brevipes (4), Xysticus Kochii (1, 4), Xysticus viaticus (4), Xysticus lateralis (1), Xysticus acerbus (3), Philodromus dispar (2),

Philodromus emarginatus (1), *Philodromus aureolus* (1, 4), *Thanatus arenarius* (1).

Clubionidae: *Clubiona neglecta* (4), *Chiracanthium elegans* (1), *Anyphaena accentuata* (3).

Attidae: *Ballus depressus* (1), *Sitticus pubescens* (2), *Carrhotus bicolor* (3), *Salticus scenicus* (2, 4), *Marpissa Rumpfi* (1), *Heliophanus cupreus* (1).

Dysderidae: *Dysdera longirostris* (1).

Dictynidae: *Dictyna arundinacea* (4).

Theridiidae: *Theridion redimitum* (4), *Dipoena melanogaster* (4).

Linyphiidae: *Linyphia marginata* (4).

Uloboridae: *Uloborus Walckenaerius* (4).

Argyropidae: *Meta reticulata* (3), *Cyclosa conica* (1, 3), *Mangora acalypha* (4), *Aranea Circe* (2), *Aranea angulata* (1), *Aranea ixobola* (1, 2), *Aranea dromedaria* (1, 3), *Aranea sexpunctata* (1), *Aranea cucurbitina* (1, 4), *Aranea Redii* (3), *Aranea* (Singa) *hamata* (4), *Theridiosoma gemmosum* Cfr. BALOGH: Zur mitteleuropäischen Verbreitung und über das Einsammeln der Spinne *Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH). *Folia Zool. et Hydrobiol.*, (Vol. IX. 1936, p. 70).

Tetragnathidae: *Tetragnatha nigrita* (4), *Tetragnatha extensa* (3, 4).

Amaurobiidae: *Amaurobius ferox* (1, 2).

Agelenidae: *Tegenaria Derhami* (2).

Oxyopidae: *Oxyopes lineatus* (4).

Pisauridae: *Pisaura Listeri* (3).

Lycosidae: *Trochosa infernalis* (2), *Trochosa terricola* (1), *Arctosa maculata* (3), *Tarantula radiata* (2, 4), *Tarentula trabalis* (1, 3), *Lycosa chelata* (1, 4), *Lycosa saccata* (4).