

Fragmenta Faunistica Hungarica

Tom. X.

1947.

Fasc. 2.

Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpatenbeckens. II.

(Mit 16 Abbildungen)

Von Dr. J. Balogh und Dr. I. Loksa

Die vorliegende Aufzählung stellt die Fortsetzung des in *Fragm. Faun. Hung.* Tom. X. Fasc. 1. p. 26—28 erschienen Artikels dar und enthält Angaben über die Unterfamilien *Erigoninae* und *Linyphiinae* (sensu E. Simon). Nur die interessanten oder sehr seltenen Arten werden besprochen, bzw. die für die Fauna des Karpatenbeckens neuen Formen. In der Aufzählung folgen auf den Artnamen zuerst die Fundstellen, dann das Sammeldatum und schliesslich der Name des Sammlers (in Klammer). Wo dieser fehlt, ist der Sammler Dr. Balogh.

Minicia marginella (Wid.): Budapest [Táborhegy], VII. 1939. (Loksa) ♀♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀. Die Art war aus dem Karpatenbecken bisher nur von Tasnád und Pócsmegyer bekannt.

Trichopterna cito (O. P. Cambr.): Soltvadkert, III. 1944 ♂. — *Tr. globipes* (L. Koch): Budapest [Táborhegy], VII. 1939 (Loksa) ♀♀; Kassa, VIII. 1934 (Móczár) ♀; Sopron, VI. 1944 (Dudich) ♀♀.

Saloca diceros (O. P. Cambr.): Zirc, V. 1940 ♂ Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 1). — *S. Kulczynskii* Mill. & Kratochw.: Gyertyánliget, VII. 1940. (Kassab Q Fodor) ♀♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♀♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀. *Saloca diceros* (Kulcz.) und *S. diceros* (O. P. Cambr.) sind zwei verschiedene Arten. Der Name der ersten Art wurde von Miller *Saloca Kulczynskii* Mill. geändert (Abb. 2).

Wideria capito (Westr.): Túrkeve, IV. 1934 ♂, ♀; Ócsa, VII. 1940 ♀; Budapest [Hármashatárhegy], V. 1940 (Loksa) ♂, ♀♀. — *W. mitrata* (Menge): Nemetmokra, VIII. 1940 ♀. — *W. antica* (Wid.): Ócsa, III. 1947 (Balogh & Loksa) ♂, ♀; Sopron, XII. 1944 (Dudich) ♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀. — *W. simplex* (Chyz.): Budapest [Budai-hegyek], III. 1936 ♂. Eine seltene Art, welche auf Grund eines einzigen Exemplares aus dem Dorfe Céke beschrieben wurde; seitdem nicht wieder gesammelt.

Trachynotus nudipalpis (Westr.) Ócsa, III. 1947 (Balogh & Loksa) ♂, ♀♀. Von Chyzer & Kulczynski von einem einzigen Fundort (Sátorajárhely) angeführt, und zwar auf Grund eines Männchen.

Walckenaera acuminata (Blackw.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀.

Tigellinus furcillatus (Menge): Máriaremete, VI. 1940 (Loksa) ♂; Sopron, VI. 1944 (Dudich) ♂. Bisher nur aus Gebieten westlich des Karpatenbeckens bekannt. Sowohl die Gattung, als auch die Art ist für die Fauna des Karpatenbeckens neu!

Cornicularia cuspidata (Blackw.): Kis-Cohárd, VI. 1941. (Jermý) ♀; Gyertyánliget, VIII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♀;




Abb. 1. *Saloca diceros* (O. P. Cambr.) ♂ Palpus von oben gesehen. — Abb. 2. *Saloca Kulczynskii* Mill. & Kratochw. ♂ Palpus von oben gesehen. — Abb. 3—4. *Lepthyphantes montanus* Kulcz. (3 = ♂ Paracymbium, 4 = ♂ Lamella characteristica). — Abb. 5. *Lepthyphantes nanus* Kulcz. ♀ Epigyne. — Abb. 6. *Sintula affinis* Kulcz. ♀ Epigyne. — Abb. 7. *Troglodyphantes cavernarum* (L. Koch) ♀ Epigyne.

Budapest [Hármashatárhegy], V. 1940 (Loksa) ♀. — *C. vigilax* (Blackw.): Visegrád, IX. 1942 (Balogh & Loksa) ♀. Bisher von drei Punkten des Gebietes bekannt, bzw. von Bodrogszerdahely, Szalánc und Homoródfürdő.

Leptorhoptrum Huithwaithi (O. P. Cambr.): Jód, V. 1944 (Loksa) ♀; Kelemen-hegység [Ilva-völgy], VIII. 1942 ♀.

Donacochara speciosa (Thor.): Sopron, XII. 1944 (Dudich) ♂♂, ♀♀; Balatonalmádi, VIII.—XII. 1946 ♂♂, ♀♀. Lebt im Röhricht verschiedener Sumpfgebiete; nach Simon sehr selten. Aus dem Karpatenbecken bisher nur von zwei Punkten bekannt (Simontornya und Kalocsa). Dudich sammelte die Art bei Sopron in Schilfbeständen und in Rohrgarben anfangs Dezember bei einer Temperatur von fast 0°. Unter ähnlichen Umständen lebt das Tier auch in den Schilfbeständen des Balaton-Sees gemeinsam mit *Eucta Isidis* (Sim.), *Eugnatha striata* (L. Koch) und *Mithion Canestrinii* (Can. & Pav.). Hier sehr häufig.

Entelecara acuminata (Wid.): Zebegény, VI. 1940 ♂, ♀♀; Sopron, V. 1944 (Dudich) ♂♂, ♀♀.

Nematogmus sanguinolentus (Walck.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂.

Trematocephalus cristatus (Wid.): Sopron, X. 1944 (Dudich) ♀♀; Visegrád, IX. 1942 (Balogh & Loksa) ♀.

Gonatium rubellum (Blackw.): Palotailva, VIII. 1942 ♀; Gyilkostó, VI. 1941 ♀; Nagy-Cohárd, VII. 1942 (Jermý) ♀; Kelemen-hegység, VIII. 1942 ♀; Gyertyánliget, VIII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♂; Szováta, VIII. 1941 (Márk) ♂. — *G. corallipes* (O. P. Cambr.): Sopron, VII. 1944 (Dudich) ♂, ♀♀. — *G. hilare* (Thor.): Sopron, IV. und X. 1944 (Dudich) ♂♂, ♀♀.

Hypomma cornutum (Blackw.): Pótharaszt, V. 1938 ♂; Sopron, VII. 1944 (Dudich) ♀. — *H. bituberculatum* (Wid.): Pótharaszt, V. 1938 ♀.

Dismodicus elevatus (C. Koch): Zebegény, VI. 1940 ♂; Sopron, V. 1944 (Dudich) ♀.

Blaniargus herbigrada (Blackw.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂, ♀♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♂; ♀♀; Gyertyánliget, VIII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♂, ♀♀; Hoverla, VIII. 1939 ♂♂, ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus], VII. 1942 ♂♂, ♀♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀♀.

Erigone vagans Aud.: Borsabánya, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♂; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♀; Ócsa, VIII. 1940 ♀; Budapest [Aranyárok], VI. 1940 (Loksa) ♂. — *E. dentipalpis* (Wid.): Bakony-hegység, V. 1940 ♂; Borsabánya, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♂♂; Borsava-hegység, VII. 1940 ♂, ♀; Budapest [Táborhegy], VI. 1940 (Loksa) ♂♂, ♀♀; Hoverla, VIII. 1939 ♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂♂, ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus], VIII. 1942 ♂; Korongyos, VII. 1942 (Jermý) ♂; Németmokra, VIII. 1940 ♀; Rákos, VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♂♂, ♀♀; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♀♀; Zebegény, VI. 1940 ♂, ♀.

Gongylidium rufipes (L.): Jósvalő, V. 1936 ♂, ♀; Ócsa, V. 1940 ♂♂, ♀♀.

Oedothorax apicatus (Blackw.): Budapest [Aranyárck], V. 1940 (Loksa) ♂, ♀; Visegrád, IX. 1942 (Balogh & Loksa) ♂♂, ♀♀. — *Oe. retusus* (Westr.): Jód, V. 1944 (Loksa) ♂, ♀; Budapest [Rákosmező], VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♂, ♀♀. — *Oe. agrestis* (Blackw.): Borsabánya, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♂, ♀; Csepel, III. 1936 ♀; Gyertyánliget, VII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♂; Gyilalja, VII. 1940 ♀♀; Hóverla, VII. 1939 ♂, ♀♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂♂, ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus], VIII. 1942 ♂, ♀♀; Lovas, VII. 1932 ♂; Németmokra, VIII. 1940 ♀♀; Palotailva, VII. 1942 ♂, ♀; Budapest [Epreserdő], VII. 1936 ♂, ♀♀; Pilis-hegység, V. 1933 ♀♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa), ♂♂, ♀♀; Túrkeve, VIII. 1940 ♂♂, ♀♀.

Gongylidiellum murcidum Sim.: Sopron, XII. 1944 (Dudich) ♀. — *G. compar* (Westr.): Kelemen-hegység [Kisilva-patak], VIII. 1942 ♂. Die Art wurde von Miller (Casopis, 33. p. 186) im Karpatenbecken bisher nur ein einzigesmal gesammelt. Für die Fauna Siebenbürgens neu.

Asthenargus paganus (Sim.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂. Zweite Angabe aus dem Karpatenbecken.

Trichoncus Kulczynskii Mill.: Budapest [Hármashatárhegy], VII. 1940 (Loksa) ♂♂. Wie auch Miller schrieb (Casopis, 32. p. 26) sind *Tr. scrofa* Sim. und *Tr. scrofa* Kulcz. zwei verschiedene Arten. Der Name der zweiten Art wurde von Miller in *Tr. Kulczynskii* Mill. abgeändert. Dieser Art gehört auch das Exemplar an, welches Kolosváry und Loksa aus Homoródfürdő als *Tr. scrofa* Sim. erwähnten. — *Tr. affinis* Kulcz.: Budapest [Hármashatárhegy], VII. 1939 (Loksa) ♂.

Sintula affinis Kulcz.: Buzsora, VII. 1940 ♀. Aus dem Wiener-Wald beschrieben. Wahrscheinlich eine subendemische Art unseres Gebietes. Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 6.).

Gnathonarium dentatum (Wid.): Budapest [Rákosmező], VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♂; Lovas, VII. 1932 ♀; Ócsa, VII. 1940 ♂, ♀; Pop-Iván, VIII. 1939 ♂, ♀; Solymár, VII. 1940 ♂♂, ♀♀; Túrkeve, IV. 1931 ♂, ♀♀; Zebegény, VI. 1940 ♂♂, ♀♀.

Sydera gracilis (Menge): Túrkeve, IV. 1931 ♂.

Microneta viaria (Blackw.): Budapest (Hármashatárhegy), IV. 1947 (Loksa) ♀♀; Buzsora, VII. 1940 ♀; Gyertyánliget, VII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♀♀; Jód, V. 1941 (Loksa) ♂, ♀♀; Marosvásárhely, VII. 1941 (Márk) ♂; Naszály, V. 1937 ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♀; Pilis-hegység, V. 1933 ♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀♀.

Microneta (?) *spinigera* Bal.: Budapest [Mátyáshegy], III. 1936 ♀; Budapest [Táborhegy], IV. 1939 (Loksa) ♂, ♀; Csepelsziget, IX. 1940 ♂. Diese interessante Art reihen wir mit Vorbehalt in die Gattung *Microneta* ein. Sie ist wahrscheinlich ein Endemismus, da sie bisher nur aus Ungarn bekannt wurde (Abb. 8—13.).

Agyneta conigera (O. P. Cambr.): Volóc, VII. 1940 ♀. Aus dem Karpatenbecken bisher nur von Suliguli und Borszék bekannt.

Aprolagus mollis (O. P. Cambr.): Budapest [Csiki-hegyek], VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♀; Budapest [Rákosmező], VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♀.




Abb. 8—13. *Microneta spinigera* Bal. (8 = ♂ Palpus von oben gesehen 9 = ♂ Palpus von der Seite gesehen. 10 = ♂ Palpus von unten gesehen, ohne Paracymbium. 11 = ♂ Paracymbium. 12 = ♀ Epigyne von oben. 13 = ♀ Epigyne von unten).

Theonina cornix (Sim.): Budapest [Hármashatárhegy], V. 1940 (Loksa) ♂. Aus dem Karpatenbecken wurden bisher zwei ♀♀ bekannt. Kulczynski beschrieb sie unter dem Namen *Bathypantes cyaneonitens*, Simon als *Bathypantes mastodon*.

Centromerita bicolor (Blackw.): Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀.

Centromerus pabulator (O. P. Cambr.): Szvidovec-hegység, VII, 1939 ♂, ♀♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♀. — *C. silvaticus* (O.

P. Cambr.): Budapest [Hármashatárhegy], V. 1939 (Loksa) ♀; Gyertyánliget, VII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♂, ♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀♀; Kelemen-hegység [Ilva-völgy], VIII. 1942 ♀♀; Kis-Cohárd, VII. 1942 (Jermay) ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♂; Pop-Iván, VII. 1939 ♀; Ratosnya, V. 1944 (Loksa) ♀; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♂, ♀♀. — *C. expertus* (O. P. Cambr.): Budapest [Hármashatárhegy] V. 1939 (Loksa) ♂♂. Aus dem Karpatenbecken sind nur zwei Fundstellen (Beregszász, Szatmárnémeti) bekannt. — *C. similis* Kulcz.: Vucskómező, VII. 1940 ♀. — *C. serratus* (O. P. Cambr.): Budapest [Budai-hegyek], VII. 1936 ♂; Budapest [Táborhegy]; VI. 1940 (Loksa) ♂; Csákvár, IV. 1937 ♂. Diese Art lebt nach




Abb. 14—15. *Centromerus serratus* (O. P. Cambr.) (14 = ♂ Palpus von der Seite, 15 = ♂ Paracymbium). — Abb. 16. *Centromerus vindobonensis* Kulcz. ♀ Epigyne.

Simon (Ar. Fr. VI. p. 722.): „Toute la France, Angleterre, Allemagne.“ Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 14—15). — *C. arcanus* (O. P. Cambr.): Borsabánya, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♀; Kelemen-hegység [Kisilva-patak], VIII. 1942 ♀; Pietrosz 2300 m, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♀♀; Pláj, VII. 1940 ♀; Ratosnya, V. 1944 (Loksa) ♂, ♀♂; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♀. — *C. vindobonensis* Kulcz.: Türkei, IV. 1934 ♀. Bisher nur aus dem Wiener-Wald bekannt. Vielleicht ebenfalls eine subendemische Art. Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 16).

Macrargus rufus (Wid.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀; Kis-Cohárd, VI. 1941 (Jermý) ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♀.

Tapinopa longidens (Wid.): Budapest [Jánoshegy] IX. 1939 ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♂; Visegrád, IX. 1942 (Balogh & Loksa) ♀.

Drapetisca socialis (Sund.): Balatonszemes, VIII. 1940 ♂, ♀; Békás-szoros, VII. 1942 (Jermý) ♀; Gödöllő, X. 1930 ♀; Gyertyánliget, VII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♀♀.

Bolyphantes alticeps (Sund.): Kelemen-hegység [Dregus], VIII. 1942 ♂, ♀; Pop-Iván, VIII. 1939 ♂. — *B. luteolus* (Blackw.): Kelemen-hegység [Retitis], VIII. 1942 ♂.

Troglochyphantes cavernarum (L. Koch): Budapest [Hármaszatárhegy], IV. 1947 (Loksa) ♀. Von L. Koch aus einer Höhle des Fränkischen-Jura (Rosenmüllerhöhle) als *Linyphia cavernarum* beschrieben. Bisher von keiner anderen Fundstelle bekannt. Unser einziges Exemplar wurde unter einem Stein gesammelt. Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 7).

Lepthyphantes alacris (Blackw.): Buzsora, VIII. 1940 ♀♀; Gyertyánliget, VII. 1940 (Kaszab & Fodor) ♀; Gyilkostó, VI. 1941 (Jermý) ♂; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂♂, ♀♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♂, ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus], VIII. 1942 ♂♂, ♀♀; Nagy-Cohárd, VII. 1942 (Jermý) ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♀♀; Pop-Iván, VIII. 1939 ♀; Ratosnya, V. 1944 (Loksa) ♂, ♀♀; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♂♂, ♀♀; Volóc, VII. 1940 ♀♀. — *L. leprosus* (Ohlert): Budapest [Báthory-barlang], IV. 1931 ♂; Budapest [Remete-barlang], V. 1930 ♀; Kőszeg, IV. 1938 (Visnya) ♂, ♀. — *L. Mughii* (Fick.): Hoverla, VIII. 1939 ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus, Kisilva-patak], VIII. 1942 ♂♂, ♀♀; Korongyos, VII. 1942 (Jermý) ♀; Pop-Iván, VII. 1939 ♀; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♂♂, ♀♀. — *L. expunctus* (O. P. Cambr.): Hoverla, VIII. 1939 ♀; Kelemen-hegység [Dregus], VIII. 1942 ♀♀; Szvidovec-hegység, VIII. 1939 ♂, ♀. — *L. cristatus* (Menge): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♀; Kőszeg, X. 1937 ♂; Ratosnya, V. 1944 (Loksa) ♂, ♀. — *L. tenuis* (Blackw.): Budapest [Budai-hegyek], V. 1930 ♀; Csepel, III. 1936 ♂, ♀; Túrkeve, VIII. 1940 ♂♂, ♀♀. — *L. tenebriicola* (Wid.): Borsabánya, VIII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♀; Hoverla, VII. 1939 ♂♂, ♀♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀♀; Jód, V. 1944 (Loksa) ♀♀; Kelemen-hegység [Dregus] VIII. 1942 ♂♂, ♀♀; Marosvásárhely, VIII. 1941 (Márk) ♂♂, ♀♀; Munkács, VIII. 1940 ♂♂, ♀♀; Nagy-Cohárd, VII. 1942 (Jermý) ♀; Pietrosz, VII. 1941 (Kaszab & Fodor) ♂♂, ♀♀; Ratos-

nya, V. 1944 (Loksa) ♀. — *L. flavipes* (Blackw.): Aszófő, VII. 1932 ♀; Csepel, III. 1936 ♀; Désakna, VIII. 1941 (Jermey) ♀; Gyilalja, VII. 1940 ♀. — *L. pygmaeus* (Menge): Aggtelek, V. 1936 ♂, ♀; Budapest [Táborhegy], V. 1939 (Loksa) ♀♀; Csepel, III. 1936 ♂, ♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀. — *L. nanus* Kulcz.: Budapest [Mátyáshegy], III. 1936 ♀; Csepel, VIII. 1940 ♀. Vielleicht ein Subendemismus; bisher nur aus Niederösterreich bekannt. Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 5). — *L. mansuetus* (Thor.): Hoverla, VIII. 1939 ♂♂, ♀♀; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♀♀. — *L. angulipalpis* (Westr.): Budapest [Csiki-hegyek], VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♀; Kaposvár, IX. 1940 ♂. — *L. Keiserlingi* (Auss.): Budapest [Mátyáshegy], III. 1936 ♀; Budapest [Táborhegy], IV. 1939 (Loksa) ♂, ♀. — *L. relativus* (O. P. Cambr.): Dobogókő, IV. 1931. ♂. — *L. montanus* Kulcz.: Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂; Hoverla, VIII. 1939 ♂; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♂. Bisher nur aus Niederösterreich bekannt. Für die Fauna des Karpatenbeckens neu (Abb. 3—4).

Poecilometes variegata (Blackw.): Borsava-hegység, VII. 1940 ♀♀; Javornec, VII. 1940 (Éhik). ♀.

Stylophora concolor (Wid.): Budapest, IV. 1939 ♂♂, ♀; Balatonszemes, VI. 1940 ♂♂; Csepel, III. 1936 ♂♂, ♀♀; Hódos-ér, V. 1940 ♀♀; Hoverla, VIII. 1939 ♀♀; Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♂, ♀; Marosvásárhely, VII. 1941 (Márk) ♂♂, ♀♀; Munkács, VIII. 1940 ♂♂, ♀♀; Pilis-hegység, IV. 1941 ♂♂, ♀♀; Rákospuszta, VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♂; Rátosnya, V. 1944 (Loksa) ♂; Túrkeve, IV. 1934 ♂♂, ♀♀; Visegrád, IX. 1942 (Balogh & Loksa) ♂, ♀. — *St. dorsalis* (Wid.): Palotailva, VIII. 1942 ♀♀. — *St. nigra* (Westr.): Hódos-ér, V. 1940 ♀; Kelemen-hegység [Ilva-völgy], VIII. 1942 ♂, ♀; Ócsa, III. 1947 (Balogh & Loksa) ♀♀; Pilisszentiván, VII. 1942 (Loksa) ♀; Palotailva, VIII. 1942 ♂, ♀; Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♀; Zebegény, VII. 1940 ♂, ♀.

Bathyphantes gracilis (Blackw.): Jádremete, XI. 1942 (Balogh & Loksa) ♀; Kassa, VIII. 1934 (Móczár) ♀; Kelemen-hegység [Kisilva-patak], VIII. 1942 ♂♂; Kőszegi-hegység, IX. 1939 ♂; Rákospuszta, VI. 1946 (Balogh & Loksa) ♂, ♀; Zebegény, VII. 1940 ♀. — *B. similis* Kulcz.: Szvidovec-hegység, VII. 1939 ♀.