

5. Szent-Ivány, Dr. J. v.: "Sketch of the zoogeographical division of the Carpathians Basin regarding the distribution of the Macrolepidoptera." (Ann. Mus. Nat. Hung. XXXI. 1937-38. Pars Zoologica, p. 129-135.)

6. Wehrli, Dr. E.: "Lepidopteren-Fauna von Marasch in türkisch Nordsyrien" (Fortsetzung.) "Die Geometriden der Ausbeute des Herrn Ernst Pfeiffer und Herrn L. Osthelder — München, aus Marasch und Bertiz, Jaila Achyr Dagh, Südost-Taurus." (Mitt. der Münch. Ent. Ges. XXIV. Jahrg., Heft II, 1934, p. 25-55.)

NEUE SPINNENANGABEN AUS UNGARN.

Von Dr. G. v. KOLOSVÁRY.

① *Dictyna civica* (Lucas). Bisher bekannt aus: Buccari, Draga gornja, Cest-Mej, Zengg (Croatien), Budapest, Szeged. Neuer Fundort dieser mediterranen Art: Tihany, Comitát Zala, an der Wand des Biologischen Institutes. Sammler: Verfasser, am 26-28. Juli 1938.

② *Nemesia pannonica* O. Herm. Bisher bekannt aus: Zimony (Vojvodina, Zemun), Insel Brac (Brazza) Dalmatien und aus dem Ofener Gebirge: 4. IV. 1938. Leg. Imre Loksa. Ein neuer Fang ebenso im Ofener Gebirge im Frühjahr 1938. Es sind also bis jetzt nur 4 Stücke vorhanden, alle in der Sammlung des Ung. Nationalmuseums. Männchen, Weibchen unbekannt.

③ *Coriarachne depressa* (L. Koch). In Hungaria rarissima. Tarsca. Neuer Fundort: Ofener Gebirge, Frühjahr 1938. Leg. I. Loksa.

④ *Tarentula pinetorum* Thorell. Nach Kulczynski: „species borealis, in cacuminibus alpium Tyrolensium occurrens, quam in l. alpe Chocs et in itinere inter Tátrafüred et Matlárháza legimus. Barlangliget“. Neuer Fund: Ofener Gebirge, Hármashatárhegy, 27. April 1938. Leg. Imre Loksa.

*Araneae Hungariae, Budapest, 1891.

Fauna Hung. 1938. 1 p. 98.

ZUSAMMENSTELLUNG DER IM JAHRE 1937 FÜR DAS KARPATENBECKEN NEU NACHGEWIESENEN TIERARTEN.

Zusammengestellt von Dr. Á. SOÓS und Dr. J. v. SZENT-IVÁNY.

Auf Anregung von Herrn Universitätsprofessor Dr. E. Dúch entschloss sich der Schriftleiter der „Fragmenta Faunistica Hungarica“ am Ende jeden Bandes eine Zusammenstellung der im vorhergehenden Jahre für das Karpatenbecken neu nachgewiesenen Tierarten zu geben. Diese Zusammenstellung enthält alle Angaben, welche in den im vorigen Jahre erschienenen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Die neu beschriebenen Arten sind durch Kursiv-Druck hervorgehoben.

Aczél, M.: Állatt. Közl. 34, H. 1-2, p. 80-82. — Tephritis Heiseri, Frfld. (Dipt.)

Balogh, J.: Zool. Anz. 119, H. 7-8, p. 221-223. —

Oppta Dorni (Acar.)

Balogh, J.: Acta Biol. Szeged 4, H. 2, p. 205-207. — Gabucinia delibata (Rob.), Analges Nitschi Haller, Megninia strigisoti (Buchh.), M. gallinulae var. maior Berl., Buchholzia fusca (Nitsch.), Truessartia minutipes (Berl.), Avenzoaria vanelli (Can.), A. limosae (Buchh.), A. Buchholzi (Can.), A. xyphiura Truess. & Megn., Pteronyssus obscurus Berl., Proctophylloides glandarius (C. L. Koch), Pr. ampelidis (Buchh.), Pr. piceae (C. L. Koch), Montesauria cylindrica (Rob.), Alloptes quadrisetatus Berl., A. crassipes (Can.) (Acar.)

Balogh, J.: Állatt. Közl. 34, H. 3-4, p. 164-169. — Nannermannia elegantula Berl., Perlohmannia dissimilis (Hewitt), Collohmannia nova Sell., Camisia biverrucata (C. L. Koch), C. segnis (Herm.), Cymbaeremaeus cymba (Nic.), Microremus brevipes (Mich.), Licneremaeus licnophorus (Mich.), Suctobelba subtrigona (Oudms.), S. trigona (Mich.), S. grandis europaea Willm., Oppia quadricarinata (Mich.), O. neerlandica (Oudms.), O. ornata (Oudms.), Carabodes areolatus Berl., Liebestadia similis (Mich.), Globozetes longipilus (Sell.), Joelia connexa

Kolosvály, 1938.

Trichoptera.

**Rhyacophila septentrionis* Mc Lach. Tihany (Abfluss des Külső-tó), Balatonhenye, Pécs. — **Agapetus comatus* Pict. Pécs (Farkas-f., Éger-v., Bodó-h.). — **Hydroptila sparsa* Curt. Tihany (Balaton, Belső-tó). — **Wormaldia triangulifera* Mc Lach. Pécs (Farkas-f., Bodó-h.). — **Plectrocnemia conspersa* Curt. Pécs (Farkas-f.). — **Psychomyia pusilla* Fbr. Tihany (Balaton). — *Hydropsyche angustipennis* Curt. Tihany (Abfluss des Külső-tó), Balatonhenye, Monoszló. — *H. instabilis* Curt. Tihany (Abfluss des Külső-tó), Balatonhenye, Monoszló. — **Beraea pullata* Curt. Pécs (Bodó-h.). — *Neuronita clathrata* Kol. Tihany (Abfluss des Külső-tó). — *Phryganea grandis* L. Tihany (Belső-tó). — *Limnophilus flavicornis* Fbr. Tihany (Balaton), Fonyód (Balaton), Monoszló. *L. lunatus* Curt. Tihany (Abfluss des Külső-tó), Monoszló. — *L. vittatus* Fbr. Balatonhenye. — *L. affinis* Curt. Tihany (Belső-tó). — **L. sparsus* Curt. Monoszló. — **Anabolia laevis* Zett. Monoszló. — **Caborius dubius* Steph. Monoszló. — **Halesus digitatus* Schrk. Monoszló, Pécs (Éger-v., Bodó-h.). — **Apocrita fimbriata* Pict. Balatonhenye (Karstquelle), Pécs (Farkas-f.). — **Silo pallipes* Fbr. Pécs (Farkas-f., Bodó-h.). — **Crunecia irrorata* Curt. Pécs (Farkas-f.). Die mit * bezeichneten Arten sind neu für das Transdanubium, *Hydroptila sparsa* Curt. für Ungarn.

NEUE SPINNENANGABEN AUS UNGARN.

Von Dr. G. v. Kolosváry.

1. *Microneta innotabilis* Cambridge. Eine westliche Art. Bisher aus Ungarn nicht bekannt. Gefunden in Pozsony.
2. *Dictyna civica* Lucas. Győr. (Legit Dr. V i s n y a). Neuer Fundort.
3. *Cnephaloceotes silus* (Cambridge). Bisher nur aus Fiume bekannt. Balatonederics (legit Györfy) 1905.
4. *Ceratinella maior* Kulczynski. Bisher nur aus den Nord-Ost-karpathen bekannt. Budapest-Margitsziget (legit C s i k i) 1905.
5. *Odiellus palpinalis* Herbst. Eine Opilioniden-Art. Bisher nur aus Croatien bekannt (Jasenak, Podsumok bei Vagab). Sie lebt in feuchten Waldungen unter Moos. Sammler Dr. P e r e g i in „Kecske-barlang“ (Kom. Borsod, Ober-Ungarn im Bükk-Gebirge) 1938.

F. H. H. H.

1939. 2.

p. 32.