

Győr-Moson-Sopron megyében napjainkig végzett arachnológiai kutatások összegzése, azok rövid ismertetése (2007)

Kovács Péter¹; Szinetár Csaba¹; Gergely Boglárka²

1. Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Állattani Tanszék

e-mail: comaroma@citromail.hu; e-mail: szcs@bdtf.hu;

2. Lukács Sándor Szakközépiskola, Győr

e-mail: gergelybogi@citromail.hu

Győr-Moson-Sopron megye első ízben ad otthont az évente megrendezésre kerülő Magyar Pókász Találkozóknak. Idén, nyolcadik alkalommal Szigetköz (Dunasziget) látja vendégül a magyar pókászokat. Ennek okán gyűjtöttük össze és mutatjuk be a megye területén napjainkig végzett arachnológiai kutatásokat. Összesen nyolc, olyan munka született, mely a megyére vonatkozó arachnológiai adatokkal szolgál: két könyvrészlet, egy önálló közlemény és egy kutatási jelentés (kézirat). Kronológiai sorrendben első az 1918-as Kulczynski munka. A műben több Soproni eredmény és egy –két Szigetközre (Hédervár) vonatkozó adat van feltüntetve. A Szigetközi Tájvédelmi Körzet 1990-es években végzett állapotfelmérés részeként készült az a kézirat, mely elsősorban a Mosoni-Duna árterén növényzetéről, valamint a lakott területekről gyűjtött 79 pókfaj listáját közli (Szinetár 1992). 1993-ban készült az a szakdolgozat, mely a Hanságban egyes kerekhálósok alkalmazkodását vizsgálta a megváltozott vegetációban (század eleji lecsapolások) (Németh Győző BDTF, 1992). Szintén a Hanság területére koncentrált az 1998-ban született szakdolgozat, mely az állaspókok (*Tetragnathidae*) elterjedését mérte fel: eredményei kimutatták, hogy mind a kilenc állaspók megtalálható a megyében a Fertő és a Szigetköz (Mecsér) vidékén (Takács Gábor BDTF 1998). Ugyanebben az évben készült el egy átfogó kutatás részeként az a munka, mely három dunántúli borókás pókjait hasonlította össze. Ezek között a Pannonhalmi-dombság lábánál található Felpéc község melletti ősbörökás lomboszlakó fajait mérték fel (Gergely Boglárka BDTF, 1993). A munka vizsgálta a boróka lomboszlakó pókegyüttesét, a szezonális változásait a stratégiai kompozíciókban, illetve a három helyszín különböző mértékű fajgazdagságát. 2002-ben a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén történt átfogó arachnológiai felmérés. A 14 helyszínről (Sopron, Balf, Sarród, Lébény, Csorna, Kapuvár, Újrónafő, Fertőrákos, Fertőújlak, Osi, Tárnokréti, Répeszemere, Csáfordjánosfa; Fertőboz) a legváltozatosabb élőhelyeken történtek a gyűjtések. Összesen 180 faj került elő, melyekből öt faj a hazai pókfaunára nézve is új (Szita és mtsi, 2002). A hazai pókfauna kutatás sajátos területét képezik a homokterületeken végzett vizsgálatok. 2006-ban született egy szakdolgozat, mely a Gönyői-erdő, homokpusztagyep talajlakó pókjainak vizsgálatát végezte, mely 2004 őszétől 2005 nyár végéig bezárólag 53 pókfajt mutatott ki (Vörösházi Tibor BDF 2006). Előkerültek ritka fajok, mint például az *Improphantes geniculatus* a *Meioneta simplicatarsis* és a védett *Atypus muralis*. A 2006-ban íródott „Magyarország tájainak növény- és állatvilága” című könyvben közölt, a megyére vonatkozó arachnológiai adatok, alapvetően a fentebb említett munkákra támaszkodtak (Szinetár, in Fekete G. Varga Z. 2006). Összességében elmondhatjuk, hogy a megye területéről közölt fajok száma a 240-et is meghaladja. Ebből öt faj a hazai pókfaunára is nézve új. A kutatások főként védett területekre koncentráltak, így a nemzeti park közvetlen térségére, illetve egyéb tájvédelmi körzetekre, természeti területekre. Előreláthatólag az elkövetkezendő egy-két évben számos további kutatás indul,

mellyel bővíthetjük majd a megyére vonatkozó arachnológiai ismereteinket.

