


**A *Pardosa vittata* (Keyserling, 1863) (Araneae, Lycosidae)
előfordulása Magyarországon**

Kancsal Béla¹, Szinetár Csaba², Fetykó Kinga³, Farkas János⁴

1. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u.16.
2. BDF Állattani Tanszék, H-9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
3. MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest-1525 pf.: 102.
4. ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A magyarországi pókfaunára nézve új farkaspók faj, a *Pardosa vittata* (Keyserling, 1863) jelenlétét sikerült kimutatnunk a Zala megyei Dióskál község határából. A hegy- és dombvidéki elterjedésű faj több hím egyede lett begyűjtve a SOWAP (Soil and Surface Water Protection) projekt keretében eltérő talajművelésű őszi búza és kukorica parcellákból. A mintavételezéshez Barber-féle talajcsapdákat használtak. Európa több országában elterjedt, nedvesebb élőhelyeket kedvelő agrofíl faj. Hasonló élőhelyekről származó adataink vannak Románia különböző területeiről. Jellegzetes ismertetőjegye a hímek második lábának első két ízén található feltűnően hosszú sertesor. Elterjedését figyelembe véve, hazai megkerülése várható volt.



Pardosa vittata Keyserling, 1863 habitusa, ivarszervei és a hím
második lábának másodvégíze oldalnézetben (Tongiorgi 1966
nyomán)