

Arachnológiai jegyzetek

Az alábbiakban két ritkábban előforduló hazai pókfajunk újabb lelőhely-adatait kívánom közölni.

Zygiella thorelli (AUSSERER, 1871) ♀

Csákánydoroszló (Vas m.) 1964. legit: L. CSABA - CHYZER-KULCZYNSKI nagy művükben Magyarország területéről nem említik, csupán a határainkon kívüli területekről sorolják fel; termőhelyét. Hazai első előfordulását (Tahi) BALOGH, J. és LOKSA I. jelentik (Fragmenta Faunistica Hung., 1946, IX, p. 12.). Tehát az itt közölt adat a második pókfajunk elterjedésére vonatkozólag.

Tarentula striatipes (DOL., 1852) ♀

Kéttornyulak (Veszprém m.), 1940. IV. legit: M. HÖRÖMPÖLY - Legelőn gyűjtött példány. - CHYZER-KULCZYNSKI ezt írja róla: „In Hungaria rara species”. A következő lelőhelyekről említik: Sátoraljaujhely, Erdőbélye, Szerencs, Budatin, Sopron, Budapest és Szamosujvár. Ezekből 5 a hazai adat. Kérdéses, hogy a fenti helyeken megtalálható-e a faj, mivel az újabb pókfaunisztikai irodalomban az ország területéről, tudomásom szerint, előfordulását nem közölték.

Hörömpöly Miklós

A Lixus scabricollis BOH. (répalevélbarkó) előfordulása Magyarországon

A Lixus scabricollis fajt BOHEMAN 1843-ban írta le. Elterjedési területeként a múlt században Franciaországot és Spanyolországot jelölik meg (STEIN és WEISE, 1877). Biológijáról az első adatokat MARSEUL (1872) közli, tápnövényeként