

Nyílt homokpusztagyep talajlakó pókjainak (Araneae) vizsgálata a Kisalföldön Gönyői-erdő (2004-2005)

Vörösházi Tibor és Szinetár Csaba

Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

e-mail: voroshazitibi@freemail.hu; szcsaba@bdtf.hu

A hazai pókfauna kutatás sajátos területét képezik a homokterületeken végzett vizsgálatok. Korábban a Duna-Tisza közí, illetve a Nyírségi mészkérülő homokpuszta gyepekben végeztek hasonló jellegű vizsgálatokat. E területek talajlakó pókjainak monitorozása 2000-től folyamatosan zajlik a Kárpát-medence homoki gyepeinek országos monitorozása keretében. Több szempontból is indokolt volt, hogy további területek is bevonásra kerüljenek a monitorozásba. Ezek között elsőként a Kisalföldre esett a választás. A tájegység kistájainak kutatótsága nagyon eltérő mértékű. A Fertő-mellék, a Hanság valamint a Szigetköz jól, a Mosoni -síkság, a Rábaköz, a Marcal-medence, illetve a Komárom-Esztergom síkság alig kutatótt pókfaunisztikai szempontból. A Gönyői-erdő nyílt homokpusztáin folytatott vizsgálat során 2004 őszétől 2005 nyár végéig zajlottak a Barber-csapdás gyűjtések. Ezek során 53 pókfaj 507 egyede került begyűjtésre. A gyűjtéseket jelentős vadkárosítás, és egy tüzeset is nehezítette. Figyelmet érdemlő faunisztikai adatok: *Atypus muralis* Bertkau, 1890; *Improphantes geniculatus* Kulczynski, 1898; *Meioneta simplicatarsis* Simon, 1884; *Styloctetor romanus* O.P-Cambridge, 1872; *Trichopterna cito* O.P-Cambridge, 1872; *Walckenaeria capito* Westring, 1861; *Alopecosa psammophila* Buchar, 2001; *Talavera aequipes* O.P.Cambridge, 1871. A tüzesetet követő vizsgálatok lehetőséget adtak a leégett és közvetlen közelében lévő kontroll területek pókfaunájának összevetésére is.